

Hauptgruppe: 75.2.1.

Infectovac® Flu Injektionssuspension

Rp

Zus.: 1 Impfdosis (0,5 ml) enth.: Oberflächenantigene v. inaktivierten Influenzaviren entspr. WHO-Empf. je 15 µg Hämagglutinin.

Weit. Bestandteile: *Natriumchlorid, Natriummonohydrogenphosphat 2H₂O, Kaliumdihydrogenphosphat, Lecithin, Wasser f. Inj.-zwecke, Spuren v. Hühnerproteinen, Polymyxin B, Hühnereiproteine, Neomycin.*

1 Fertigspr. 0,5 ml mit Kanüle		29,82		PZN 0740607
10 Fertigspr. 0,5 ml mit Kanüle		209,58		PZN 0740613

Anw.: Vorbeug. d. Influenza b. Erw. u. Kdr. >6. Lebensmon.

Gegenanz.: [I 7 a](#) [[Akut Erkrankte](#)]. Hühnereiweißallergie. I.v. Anw.

Schwang.: Strenge Ind.-Stellung [Gr 4](#) [[Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Menschen liegen nicht vor. Der Tierversuch erbrachte keine Hinweise auf embryotoxische/teratogene Wirkungen.](#)] (begrenzte Erfahr.).

Nebenw.: [I 7](#) [[Lokalreaktionen \(Rötungen, Schwellungen, Schmerzen\); Allgemeinreaktionen \(z. B. Kopfschmerzen, Temperaturerhöhung, Krankheitsgefühl\); Allergische Reaktionen \(selten\)](#)]. Lokalreakt.: Ekchymose, Verhärt. System. Reakt.: Unwohls., Frösteln, Müdigk., Schwitzen, Myalgie, Arthralgie. Gelegentl.: General. Hautausschläge m. Juckreiz, Urtikaria u. nichtspezif. Ausschlag. Selten: Neuralgie, Parästhesien, Krampfanf., vorübergeh. Thrombozytopenie, Schock. Sehr selten: Vaskulitis m. Nierenbeteil., Enzephalomyelitis, Neuritis, Guillain-Barré- Syndrom.

Wechselw.: Gleichz. Applikat. and. Impfstoffe an unterschiedl. Körperstellen mögl., unerwünschte Reakt. können verstärkt sein. Vermind. Immunantwort b. immunsuppressiver Behandl. Falsch pos. Resultate b. serolog. Tests (ELISA).

Hinw.: Nicht mit and. Impfstoffen mischen.

Dos.: Erw. u. Kdr. ab 36 Mon.: 0,5 ml; Kdr. 6-35 Mon.: 0,25 ml, bisher ungeimpfte Kdr. sollten nach mind. 4 Wo. eine zweite Impfdos. bekommen.

Lag.: Lagerungshinweis!